

Los penacho amarillo llegaron a aparearse

Al comienzo de la primavera se toma esta isla la mayor población de esta especie en Sudamérica.

ROLANDO MARTÍNEZ

PUNTA ARENAS.— En la isla Noir (negra en francés) nidifica la colonia más importante de pingüinos penacho amarillo de toda Sudamérica.

Ocupa su sitio en la periferia de los canales australes y cerca del mar de Drake, región de Magallanes. Allí, los *Eudyptes chrysolophus* alcanzan los 316.400 ejemplares.


En una superficie de 15 km de largo por 3 km de ancho, el escenario es propicio para que este pingüino de plumas largas y amarillas, como si fuesen cejas sobre sus ojos y que se elevan como un penacho, viva tranquilo su período de reproducción.

Lluvias y vientos marcan los días de esta isla de cara al Pacífico sur, que desde 2003 ha sido estudiada por el biólogo Alejandro Kusch, quien integró la primera expedición a esta zona junto a los investigadores estadounidenses David Oehler y Scott Dreischman, y el ornitólogo Manuel Marín.

¿Qué se hacen?

Con ayuda de la fundación estadounidense FeatherLink censan la población de la especie y los siguen por satélite para descubrir cuán lejos llegan nadando en el mar.

Kusch revela que la isla Noir no posee un estado de protección legal y —por ende— no está dentro de las Áreas Marinas Costeras Protegidas. "Es una ta-



EL MERCURIO



ALEJANDRO KUSCH

URBE PINGÜINA.— Hay 17 colonias de penacho amarillo en la isla Noir. También llegan pingüinos Macaroni. Sus enemigos son los caranchos negros, que comen huevos y polluelos. Las orcas los persiguen en el mar.

En dichas islas del Atlántico sur había 3 millones de parejas hace poco más de un siglo y hoy bordean las 300 mil.

Quizás influyó directamente el ser humano o la sobreexplotación del área, según indican los expertos en el tema. Su depredación

comenzó a mediados del siglo XIX, cuando los balleneros europeos llenaban barriles con sus huevos y luego salaban la carne del ave para usarla como provisión de alimentos.

En el año 1860 la caza se tornó muy lucrativa por cada pingüino capturado. Sólo en tres años se mataron cerca de 500 mil ejemplares, pero ahora la realidad es distinta.

No se descarta que la población en la isla Noir siga aumentando y Kusch resalta que este lugar se convierte en un verdadero "laboratorio natural" donde conviven estas aves y se enfrentan con sus enemigos.

Entre ellos se destacan las skutas y caranchos negros, que se alimentan de huevos y de los polluelos, y también los lobos comunes y las orcas, que persiguen a los ejemplares juveniles y adultos en el mar.



Requieren vegetación

Los penacho amarillo (60 cm de altura) eligen los lugares más altos, con abundante vegetación y de difícil acceso para anidar. En la isla conviven con unas 15 mil parejas de pingüinos Macaroni (70 cm), que arman sus nidos en áreas planas y pedregosas. Ambas especies colocan dos huevos, pero siempre sólo uno de ellos es fértil. Comienzan a copular a fines de octubre y en noviembre desovan. Los pichones nacen al mes. Cambian el plumón por un plumaje mejor adaptado al agua; saltan al mar a fines de febrero.